


Mellt - mae'r egni o'r mellt yn achosi i nitrogen a dŵr ffurfio amonia a niriadau sy'n trafeilio lawr i'r ddaear mewn dŵr glaw.



Aer - caiff carbon deuocsid ei amsugno i'r dail a chaiff ocsigen ei ryddhau trwy ffotosynthesis, pan fydd golau. Yn y twyllwch, bydd planhigion gwyrdd yn amsugno ocsigen ac yn rhyddhau carbon deuocsid.




Glaw - caiff dŵr ei ddefnyddio i doddi a chludo mwynau o'r pridd i mewn i'r planhigyn.

Dail - y ffatrïoedd bwyd lle caiff golau, dŵr a charbon deuocsid eu troi'n fwyd i'r planhigyn trwy broses o'r enw ffotosynthesis.

Cwmp Dail - yn lleihau gwrthiant gwynt a thrydarthiad (colli dŵr trwy'r dail) yn y gaeaf. Bydd y dail yn pydru ar y ddaear ac yn dychwelyd eu mwynau i'r pridd.

Blodau - rhannau atgenhedlu'r planhigyn, sy'n aml yn defnyddio lliw new arogl i ddenu pryfed.



Canghennau - yn cynnal y dail yn y lle gorau i ddal ynni golau o'r haul.

Coesyn neu Fôn - yn cynnal canghennau ac yn cludo bwyd i lawr i'r gwreiddiau a meynau i'r corun (pen y goeden).

Rhisgl - y 'croen' allanol sy'n diogelu rhag yr haul, glaw, ffyngau ac anifeiliaid.

Cambiwm - yr haenen denau iawn sy'n gwneud haenen newydd o wynnin bob blwyddyn.

Gwynnin - mae ganddo lawer o diwbiau bach sy'n cludo dŵr a mwynau (sudd) o'r gwreiddiau i bob rhan o'r goeden a bwyd o'r dail i weddill y goeden.

Rhuddin - yn rhoi nerth i'r bôn ac yn cael ei ddefnyddio i gadw gwastraff.

Halwynau Mwynol - caiff potasiwm, ffosfforws, magnesiwm ac elfennau hybrin eu cymryd o'r pridd.

Gwreiddiau Bwydo - mae rhain yn chwilio am leithdar a maetholion o'r pridd ac yn eu casglu.

Prif Wreiddyn - yn dal y planhigyn yn gadarn yn y ddaear ac yn defnyddio cyflenwadau dŵr dyfnach.